

# Nemasys® H



Avanceret biologisk produkt til havebrug

Til bekæmpelse af larvestadie af øresnudebiller (*Otiorhynchus sulcatus*) tilstede i jord eller potter/bed

Indeholder gavnlige nematoder fra familien *Heterorhabditis* sp. (82%) og et fyldstof incl. vand (18%)

Produktet er egnet til økologisk produktion (RCE n° 834/2007)

## Anbefalet dosering

Anvendelses metode	Anvendelses volume	Anvendelse	Dosering	Pakke størrelse 50 million	Pakke størrelse 250 million
Åben jord	4 liter/m <sup>2</sup>	kurative	1,000,000/m <sup>2</sup>	50m <sup>2</sup>	250m <sup>2</sup>
Potter/beholder/bed			500,000/m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup>	500m <sup>2</sup>
Jordbær	100ml/plante		25,000/planter	2000 planter	10,000 planter

Nedenstående tabel giver volumen af fortyndet Nemasys® H påkrævet for forskellige potte størrelser.

Potte volume (L)	Væske/potte (ml)	Antal potter / 50 million pakke	Antal potter/ 250 million pakke
1	46	8708	43542
2	81	4940	24702
5	166	2404	12020
7.5	226	1773	8863
10	278	1437	7187
12	317	1263	6315
14	353	1135	5673
16	386	1036	5180
18	418	958	4788
20	448	894	4469
22	476	841	4203
25	516	776	3879
30	576	695	3474
35	629	636	3179
40	677	591	2954
45	720	556	2778

### Rygspøjte anvendelse:

Lav en stamopløsning: Bland en 50 mio. Nemasys® H i 10 ltr. vand i en ren målespand. Omrør stamopløsningen og fortynd på følgende måde:

- Til åben jord, brug 1 del stamopløsning + 19 dele vand.
- Til potter/beholder, brug 1 del stamopløsning + 39 dele vand.
- Hold blanding under konstant bevægelse/omrøring og anvend omgående med 4 liter/m<sup>2</sup>

### Dryp-vandings metoden:

- For at sikre jævn dosering skiftes flere gange mellem vandingssektionerne.
- Tillad nok tid til at nematoderne kan nå frem til den beregnede del af afgrøden.
- Skyl systemet med rigeligt vand for at nematoderne kommer ud af drypvandingsanlæg.
- Kontakt din leverandør for at bestemme om dit drypvandingsanlæg er egnet.

## BRUGSANVISNING

- Fjern alle fine filtre (0.3 mm eller finere) fra udstyret.
- Fyld tanken delvist med koldt rent vand. Start omrøring og forsæt indtil udførelsen er fuldst.
- Tøm en bakke ned i en spand og tilføj min. 10 ltr. vand.
- Omrør indholdet grundigt og sikre at hele produktet bliver blandet.
- Hæld nematoderne ned i sprøjtetanken gennem en sigte.
- Fyld sprøjtetanken op til det anbefalede vandniveau.
- Den tilberedte blanding anvendes omgående til kulturen med den relevante dosering.
- Overvåg omgående efter udbringning for at få nematoderne ned i jorden. Undgå afrending fra potten.

## BETINGELSER FOR ANVENDELSE

### For optimalt resultat:

- Behandling skal udføres når øresnudebillerne er tilstede.
- Jordens eller andet vækstmedies temperatur bør være mellem 12°C eller 30°C i min. 2 uger efter behandling.
- Jorden eller andet vækstmedie skal være fugtig.
- Behandle rutinemæssigt nyt plantemateriale som kommer ind i væksthuset, da det kan indeholde øresnudebillens larver.
- Hvis produktet er anvendt ved sprøjtning ud over blade, skal det skylles ned umiddelbart efter med rent vand.
- Gennemblødningsmetoden: Er den optimale metode, især når bladmassen er tæt.
- Anvendelse i jordbær: Ud vand omkring basis af hver enkelt plante, undgå afrending.

## FORHOLDSREGLER

- Nematode-blandingen skal være under konstant omrøring under anvendelse.
- Brug ikke nematoderne efter sidste holdbarhedsdato eller efter fejl-opbevaring.
- For oplysninger vedr. hvilke kemikalier som er tolerant med Nemasys® H spørg deres distributor eller se [www.beckerunderwood.com](http://www.beckerunderwood.com)
- Hele pakken skal bruges straks efter åbningen (opdel ikke pakken, opbevar ikke åbne pakker eller opblandet væske).
- Nemasys® H virker i ca. 4 uger, larver som udklækkes fra æg, som er lagt efter dette tidspunkt, er sandsynligvis ikke bekæmpet.
- Nemasys® H kan ikke kontrollere voksne gåsebiller.
- Nematoderne tåler ikke tryk over 300 psi/20 bar/2000 kPa pump tryk.
- Dyser størrelsen skal være mindst 0.5 mm

## OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE

**Opbevaring:** Ved modtagelsen, bruges omgående, eller opbevares i et køleskab ved 5°C. MÅ IKKE FRYSES. Brug hele indholdet af pakken på én gang. Fordel eller opdel ikke pakken da hver pakke indeholder en afmålt dosis af nematoder. Opbevar ikke en oplanding. OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN. DISSE PRODUKTER INDEHOLDER LEVENDE ORGANISMER, SOM KRÆVER SPECIAL HANDLING OG VEJLEDNING. FØLG DISSE PROCEDURER OMHYGGELIGT FOR AT OPNÅ MAXIMAL AKTIVITET.

**Bortskaffelse:** Produkt- og emballageaffald som stammer fra brug af dette produkt, eller ubrugt, over dato, kan bortskaffes på stedet eller hos et godkendt renovationsanlæg i overensstemmelse med de lokale regler.

## GARANTI ANSVARSFRASKRIVELSE

Becker Underwood, Inc. garanterer at dette produkt er i overensstemmelse med beskrivelsen på etiketten og efter al rimelighed egnet til formålet, som beskrevet på etiketten når brugt i overensstemmelse med vejledningen. BECKER UNDERWOOD, INC. FRASKRIVER SIG ALLE ANDRE GARANTIER, ENTEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, HERUNDER DE INDIREKTE GARANTIER AF SALGSBARHED OG EGNETHED TIL SPECIELLE FORMÅL.

## RETSMIDLER

Erstatning for tilskadekomst eller skader pga. dette produkt er begrænset til, (Becker Underwoods eget skøn), udskiftning af produktet eller refundering af indkøbsprisen. Under ingen omstændigheder er Becker Underwood, Inc. ansvarlig for utilsigtede skader, følgeskader eller specielle skader.

## BEGRÆNSNING AF ANSVAR

Ingen er godkendt til at ændre eller tilføje, enten mundtlige eller skriftlige erklæringer på etiketten. Becker Underwood, Inc. og sælgeren er ikke ansvarlig for personlige skader, ejendomsskader eller tab, inklusiv kulturskader eller manglende ydeevne pga. omstændigheder, som de ikke har kontrol over. Herunder produktbrugerens inkompetence for at overholde retningslinjerne. Køber og bruger påtager sig alt ansvar for disse begivenheder.